

L'INNOVATION BIOLOGIQUE CONTRE LES PIQUEURS SUCEURS

UN BIOINSECTICIDE DE NOUVELLE
GÉNÉRATION POUR VOS PROGRAMMES DE
LUTTE ANTIPARASITAIRE

Utilisation à spectre croisé

Plusieurs modes d'action

Pas de LMR

Sans danger pour
les insectes auxiliaires



GRANDEVO®



BIOINSECTICIDE

ROSE

GRANDEVO®

BIOINSECTICIDE

CULTURES HOMOLOGUÉES



GRANDEVO® est un bioinsecticide innovant composé de métabolites secondaires de la bactérie *Chromobacterium subtsugae* et permet un contrôle durable et à large spectre. **GRANDEVO®** contient plusieurs composés actifs qui repoussent, réduisent la reproduction et provoquent la mortalité par ingestion d'un large spectre de ravageurs piqueurs suceurs et empêche ainsi leurs développements. Cette solution performante vous offre les meilleurs avantages des micro-organismes et garantit une efficacité élevée et constante dans le temps. Ainsi, **GRANDEVO®** renforce la performance, la fiabilité et la cohérence de vos programmes de lutte contre les ravageurs. **GRANDEVO®** contient plusieurs composés actifs qui repoussent, réduisent la reproduction et provoquent la mortalité d'un large spectre de ravageurs piqueurs suceurs et empêche ainsi leurs développements.

AVANTAGES

- Multimode d'action pour une efficacité accrue sur un large spectre de ravageur
- Aucune toxicité aiguë pour les abeilles adultes, facile pour les pollinisateurs et les insectes bénéfiques
- Approuvé pour les applications au champ et en serre
- Multiples modes d'action : répulsif, mortalité par ingestion, perturbation de la reproduction
- Hautement compatible avec les programmes de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) et de gestion de la résistance des insectes (IRM)
- Reste stable même aux températures extrêmes
- DLUO supérieur à 2 ans

*Pour les détails et les précautions d'emploi, se référer à l'étiquette.

Porter des gants et un masque pour manipuler le produit. Ne le laissez pas à la portée des enfants.

BÉNÉFICES



Flexibilité

Utiliser seul ou dans des programmes



Simplicité

Compatible avec les mélanges en réservoir & longue durée de vie



Efficacité

Plusieurs composés actifs



Naturel

DS 4-Heures & 0-jours DAR

CULTURE	PARASITE	TAUX D'APPLICATION	APPLICATION & FRÉQUENCE
French beans	Aleurodes	3Kg/Ha dans 1000L d'eau 60g/20 Litres d'eau	• Appliquer GRANDEVO® pendant la floraison depuis la période d'éclosion jusqu'au stade adulte des aleurodes. • 3 applications tous les 7 jours en cas d'infestation prolongée • Pulvérisation foliaire à l'aide d'un équipement de pulvérisation conventionnel
Intervalle avant récolte : 1 jours			Niveau avant entrée : 4 heures

COMPOSITION

Chromobacterium subtsugae

souche PRAA4-1T et milieu de fermentation utilisé (30 %)

PACKAGING

Sac : 2kg

Formulation :


WDG (granulés dispersables dans l'eau)



PLUS D'INFORMATION

- Témoins non traité
- Grandevo 2kg/ha
- Grandevo 2.5kg/ha
- Grandevo 3kg/ha
- Lecatech 0.25hg/ha

Essai au Kenya sur les haricots verts - aleurodes



NOTES

GRANDEVO®

Mode d'action



1
Toxicité orale



2
Répulsion



4
Oviposition réduite



3
Fécondité réduite



Distribué par

KENYA BIOLOGICS LTD
SUBSIDIARY OF ELEPHANT VERT GROUP
PO Box 4560, Thika 01002
KENYA



Marketing

ELEPHANT VERT FRANCE
5 Cours du Danube 77700 SERRIS France
+33 (0)1 60 17 98 14
export_evfrance@elephant-vert.com
www.elephant-vert.com