

LA SOLUTION NATURELLE CONTRE LES THRIPS, LES ACARIENS ET LES MOUCHES

UN BIOINSECTICIDE AVANCÉ QUI RÉDUIT
LE RISQUE DE RÉSISTANCE DES INSECTES

Pas de LMR

DAR 0 jour

Plusieurs modes
d'action

Sans danger pour
les insectes auxiliaires



VENERATE®



BIOINSECTICIDE

ROSE / MARAÎCHAGE

VENERATE®

BIOINSECTICIDE

CULTURES HOMOLOGUÉES



VENERATE® est un bioinsecticide innovant composé de métabolites secondaires provenant d'une souche sélectionnée de la bactérie **Burkholderia rinojensis**. Les composés actifs de **VENERATE®** induisent la mortalité par ingestion et/ou contact et empêchent le développement de populations nuisibles de ravageurs suceurs. Ils permettent ainsi un contrôle durable et à large spectre. Cette solution innovante vous offre les meilleurs avantages des micro-organismes et garantit une efficacité élevée et constante. **VENERATE®** est le candidat idéal pour renforcer les performances, la fiabilité et la cohérence des programmes de lutte contre les nuisibles.

AVANTAGES

- Réduit le risque de résistance des ravageurs
- Pas de nombre maximum d'applications/saison
- Sans danger pour les auxiliaires et pollinisateurs
- Stable même à des températures extrêmes
- Durée de conservation supérieur à 2 ans
- Multimode d'action pour une meilleure efficacité
- 0 LMR & 0 DAR
- Recommandé dans les programmes de lutte intégrée (IPM) et de gestion intégrée des risques (IRM)

*Pour plus de détails et de précautions, reportez-vous à l'étiquette.
Porter des gants et un masque lors de la manipulation du produit. Ne pas laisser à la portée des enfants.

BÉNÉFICES



Efficacité

Cible une grande variété de parasites



Simplicité

Compatible avec les mélanges en réservoir & longue durée de vie



Performance
Haute efficacité



Naturel
Pas de MLR et non toxique

CULTURES	NUISIBLES	DOSE	APPLICATION & FRÉQUENCE	INTERVALLE AVANT RÉCOLTE
Maïs	Légionnaire d'automne Spodoptera frugiperda	9L/hectare 1.8L/20 Litres d'eau	Appliquer en pulvérisation foliaire à l'aide d'un équipement de pulvérisation conventionnel Appliquer 3 fois par saison à 7 jours d'intervalle Il est important de bien choisir le moment de l'application ciblant les larves nouvellement écloses, les nymphes ou les ravageurs immatures.	0 jours

COMPOSITION

Cellules mortes de la souche A396 de **Burkholderia rinojensis** et milieux de fermentation (94,46 %)

PACKAGING


Bouteille : 10L

Formulation : **SC (Suspension Concentrée)**



PLUS D'INFORMATION

Réduction efficace des thrips sur les poivrons



Temps d'application	
A	B
16-Avr	23-Avr
Essai de printemps	

NOTES

VENERATE® Mode d'action



Pulvérisation
Sur la plante



Ingestion

Les insectes et les acariens peuvent être tués par ingestion des dépôts de pulvérisation ou en se nourrissant du feuillage traité. La mort survient 4 à 7 jours après l'ingestion.



Contrôle résiduel

Contrôle résiduel supérieur des lépidoptères sensibles par rapport aux insecticides Bt. Lépidoptères et un éventail plus large d'espèces de ravageurs.



Interférence alimentaire

Entrave le comportement de sondage des insectes piqueurs/suceurs et des acariens, interrompt rapidement l'alimentation des insectes piqueurs mâcheurs.



Distribué par

KENYA BIOLOGICS LTD
SUBSIDIARY OF ELEPHANT VERT GROUP
PO Box 4560, Thika 01002
KENYA



Marketing

ELEPHANT VERT FRANCE
5 Cours du Danube 77700 SERRIS France
+33 (0)1 60 17 98 14
export_evfrance@elephant-vert.com
www.elephant-vert.com